

ANTIBIOTHERAPIES PAR VOIE IV disponibles en pharmacie de ville

VILLEHOPITAL.fr

Famille	DCI	Spécialité	Stabilité	Administration
---------	-----	------------	-----------	----------------

Inhibiteurs de la synthèse des enveloppes bactériennes – Béta Lactamines

Pénicillines Groupe A	Amoxicilline	Clamoxyl®	6h dans NaCl 1h dans Glucose	IV lente sur 3 à 5 minutes Perfusion IV sur 20 à 30 minutes
	Amoxicilline + Acide Clavulanique	Augmentin®	1h dans NaCl	IV lente sur 3 à 5 minutes Perfusion IV sur 30 minutes à 1 h
Pénicilline Groupe M	Oxacilline	Istopen®	24h dans NaCl 24h dans Glucose	IV lente sur 3 à 5 minutes Perfusion IV sur 20 à 30 minutes Perfusion IV continue
Uréidopénicillines	Piperacilline + Tazobactam	Tazocilline®	24h dans NaCl 24h dans Glucose	IV lente sur 3 à 5 minutes Perfusion IV sur 20 à 30 minutes Perfusion IV continue
Carbapénèmes	Imipénem + Cilastatine	Tienam®	4h dans NaCl 4h dans Glucose 24h au frigo	Dilution impérative Perfusion IV sur 30 à 40 minutes Perfusion sur 4h si nausées
	Meropenem	Méronem®	8h dans NaCl 2h dans Glucose	IV lente sur 5 minutes Perfusion IV sur 15 à 30 minutes Perfusion IV continue
Monobactame	Aztréonam	Azactam®	24h dans NaCl 2h dans Glucose	IV lente sur 3 à 5 minutes Perfusion IV sur 20 minutes à 1 h
Céphalosporines 3 ^{ème} génération	Cefepime	Axepim®	24h dans NaCl 24h dans Glucose	Perfusion IV sur 20 à 30 minutes Perfusion IV continue
	Ceftazidime	Fortum®	12h dans NaCl 12h dans Glucose	IV lente sur 3 à 5 minutes Perfusion IV sur 15 à 30 minutes Perfusion IV continue
	Ceftriaxone	Rocephine®	24h dans NaCl 24h dans Glucose	IV lente sur 3 à 5 minutes Perfusion IV sur min 30 minutes

Inhibiteurs de la synthèse des protéines

Aminosides	Amikacine	Amiklin®	24h dans NaCl 24h dans Glucose	IV lente sur 3 à 5 minutes Perfusion IV sur 30 minutes à 1 h
	Gentamicine	Gentalline®	24h dans NaCl 24h dans Glucose	IV lente sur 3 à 5 minutes Perfusion IV sur 30 minutes à 1 h
	Tobramycine	Nebcine®	24h dans NaCl 24h dans Glucose	IV lente sur 3 à 5 minutes Perfusion IV sur 20 minutes à 1 h

Inhibiteurs de la synthèse des acides nucléiques - Quinolones

Fluoroquinolones	Ciprofloxacine	Ciflox®	Prêt à l'emploi	Perfusion IV sur 1h
------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------------

Autres

Anti tuberculeux	Rifampicine	Rifadine®	24h dans NaCl 24h dans Glucose	Perfusion IV sur 30 minutes à 3 h
Antiviral	Aciclovir	Zovirax®	8h dans NaCl Jamais dans Glucose	Perfusion IV sur 1 h